


VivaDiag™ Pro

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
Příbalový leták

1) Odběr vzorků

- Výtěr z nosu (doporučeno) - Nasal swab

Je důležité získat co nejvíce sekrece. Vložte sterilní tampon do jedné nosní dírky. Špička tamponu (tyčinky) by měla být zasunuta až 2,5 cm (1 palec) od okraje nosní dírky. Otřete tampon 5krát podél sliznice uvnitř nosní dírky, abyste zajistili shromažďování hlenu i buněk. Tento postup opakujte pro druhou nosní dírku, abyste zajistili, že z obou nosních dutin bude odebrán odpovídající vzorek (použijte stejný tampon).




Před testováním nechte testovací zařízení a extrakční roztok ekvilibrovat na 15-30°C.

1. Utevřete zatavenou tubu s extrakčním roztokem




2. Odeberte vzorky, viz **Odběr vzorků**.


3. Vložte tampon (tyčinku) se sebraným vzorkem do extrakční zkumavky naplněné extrakčním roztokem. Tampón (tyčinku) 5-krát zatoče a přitom přitlačte hlavu proti spodní a boční straně extrakční trubice. Odstraňte tampon a současně stlačte boky zkumavky, aby se z tamponu vytáhla kapalina. Pokuste se uvolnit co nejvíce tekutiny. Použitý tampon zlikvidujte jako biologicky nebezpečný odpad.




4. Nasadte špičku tuby.



5. Vyjměte testovací zařízení z uzavřeného fóliového sáčku a položte jej na čistý a rovný povrch.
6. Naneste 3 kapky extrahovaného vzorku do jamky na vzorek. Během aplikace se prosím vyhněte bublinám.



7. Odečtěte výsledek testu za 15 minut. Nečtěte výsledek po 20 minutách.



1. Pozitivní výsledek:

Objeví se jak linie kontroly kvality C, tak linie detekce T.

2. Negativní výsledek:

Objeví se pouze řádek kontroly kvality C, na řádku detekce se neobjeví žádný další řádek.

3. Neplatný výsledek:

Řádek kontroly kvality C se nezobrazí, což znamená, že test je neplatný, bez ohledu na to, zda se detekční řádek objeví nebo ne. Sbírejte nový vzorek a provedte další test s novým testovacím zařízením.

